Dr Olivier Kadoch
Gynécologie-obstétrique · Chirurgie gynécologique

FIN DE GROSSESSE · PRÉVENTION

Le streptocoque B et ma grossesse

Souvent portée sans le savoir, elle est recherchée avant le terme pour protéger bébé à la naissance.

34 – 38 SA
PRÉLÈVEMENT VAGINAL

Un écouvillon (long coton-tige) passé dans le vagin jusqu'à la vulve, puis mis en culture. Dépistage **systématique, à chaque grossesse**.

De quoi s'agit-il ?

- Une bactérie courante de l'intestin et du vagin : selon les pays, 10 à 30 % des femmes enceintes en sont porteuses
- Souvent sans symptôme ; ce n'est pas une infection sexuellement transmissible

Quel risque pour bébé ?

- Elle se transmet surtout au moment de l'accouchement
- Rarement, infection grave du bébé : sang (sepsis), poumons, méninges
- Un antibiotique pendant le travail diminue ce risque

Qui reçoit l'antibiotique pendant le travail ?

- Les femmes dont le prélèvement de fin de grossesse est positif
- Celles dont un enfant précédent a fait une infection à streptocoque B
- Celles chez qui la bactérie a été trouvée dans les urines pendant la grossesse
- Sans résultat connu : en cas de naissance prématurée, de poche des eaux rompue depuis plus de 12 h ou de fièvre (plus de 38 °C)

1. **Pas d'antibiotique pendant la grossesse pour un simple portage vaginal** : la prévention se fait à l'accouchement.
2. **Contractions régulières ou perte des eaux : allez à la maternité** et signalez votre résultat. L'antibiotique (pénicilline G ou amoxicilline) est perfusé au plus tôt ; il est jugé suffisant s'il débute au moins 4 heures avant la naissance. Allergie à la pénicilline : signalez-la, un autre antibiotique sera choisi.

Bon à savoir

Césarienne programmée avant tout travail, poche intacte : antibiotique en général inutile. Bébé reste surveillé à la maternité au moins 48 heures.

Bébé, jusqu'à ses 3 mois

Fièvre (38 °C ou plus) ou corps froid, refus de boire, vomissements, bébé mou ou très endormi, respiration difficile : appelez le 15 (ou le 112).

Sources · ANAES, Risque infectieux bactérien néonatal précoce : prévention anténatale, 2001 · SFN-SFP (label HAS), Nouveau-né à risque d'infection précoce (≥ 34 SA), 2017 · ACOG, Committee Opinion n° 797, Obstet Gynecol 2020, PMID 31977795 · OMS, Streptocoque du groupe B, aide-mémoire, 2026.

107 avenue Victor Hugo, 75116 Paris · Centre Geoffroy Saint-Hilaire, 75005 Paris
docteurkadoch.com · Docteur Kadoch Olivier, Paris, France

Document d'information · nov. 2026.
Il ne remplace pas la consultation.