Dr Olivier Kadoch
Gynécologie-obstétrique · Chirurgie gynécologique

GYNÉCOLOGIE · INFECTIONS

IST et infection des trompes

Une infection sexuellement transmissible (IST) peut passer totalement inaperçue. Un test au bon moment et un traitement rapide préservent votre santé et votre fertilité.

SOUVENT SANS AUCUN SIGNE

Chlamydia, gonocoque, *Mycoplasma genitalium*, trichomonas, syphilis, herpès, papillomavirus (HPV), VIH, hépatite B… Beaucoup de ces infections ne provoquent aucun symptôme : seul un test permet de le savoir.

Le dépistage

- Chlamydia : test conseillé à toutes les femmes sexuellement actives de **15 à 25 ans**, enceintes comprises
- À refaire **chaque année** s'il est négatif, en cas de rapport sans préservatif avec un nouveau partenaire ; après 25 ans, selon votre situation
- Sans ordonnance en laboratoire (VIH, chlamydia, gonocoque, syphilis, hépatite B) : gratuit avant 26 ans ; test VIH gratuit à tout âge
- Gratuit aussi dans les CeGIDD et certains centres de santé sexuelle

La protection

- Le **préservatif** protège du VIH et réduit le risque des autres IST ; il est gratuit en pharmacie, sans ordonnance, avant 26 ans
- Des vaccins existent contre le HPV et l'hépatite B
- En cas d'IST, le ou les partenaires récents sont testés et traités
- Pas de rapport sexuel avant la fin du traitement (en général 7 jours)
- Nouveau test 3 à 6 mois après une chlamydia

L'infection des trompes (salpingite ou infection génitale haute)

Elle complique parfois une IST non traitée, comme une chlamydia. Les signes à connaître :

- Douleur du bas-ventre, le signe principal
- Fièvre
- Pertes inhabituelles
- Saignements en dehors des règles

Le traitement associe plusieurs **antibiotiques** pendant 10 à 14 jours. Dans les formes compliquées (abcès), il se fait par perfusion, avec parfois un drainage. Un contrôle est prévu 3 à 6 mois après.

Consultez rapidement

Devant une douleur du bas-ventre, surtout avec de la fièvre. Le traitement ne doit pas être retardé.

Les séquelles possibles

Surtout si l'infection se répète : infertilité, douleurs chroniques du bassin, grossesse extra-utérine.

Sources · HAS, Réévaluation du dépistage des infections à Chlamydia trachomatis, 2018 · Brun JL et al., CNGOF-SPILF, Infections génitales hautes, Gynecol Obstet Fertil Senol 2019 (PMID 30880245) · Ah-Kit X et al., CNGOF-SPILF, suivi après IGH, 2019 (PMID 30878686) · CDC, STI Treatment Guidelines 2021 (PMID 34292926) · service-public.fr, Dépistage IST (06/2026) · Santé.fr, Où se faire dépister gratuitement ; Préservatifs gratuits.

107 avenue Victor Hugo, 75116 Paris · Centre Geoffroy Saint-Hilaire, 75005 Paris
docteurkadoch.com · Docteur Kadoch Olivier, Paris, France

Document d'information · nov. 2026.
Il ne remplace pas la consultation.