Dr Olivier Kadoch
Gynécologie-obstétrique · Chirurgie gynécologique

GROSSESSE · SURVEILLANCE

Placenta bas inséré

Le placenta assure les échanges entre vous et votre bébé. Il arrive qu'il se fixe dans la partie basse de l'utérus : une surveillance est alors organisée, et cette position se corrige très souvent avant le terme.

DEUX SITUATIONS DIFFÉRENTES

Placenta bas : son bord est à moins de 2 cm de l'orifice du col. **Placenta recouvrant** (praevia) : il couvre cet orifice. L'échographie du 2e trimestre est souvent celle qui le montre.

Le cas le plus fréquent

L'utérus, en grandissant, éloigne le placenta du col : environ 9 fois sur 10, il n'est plus bas au terme. Une échographie de contrôle, si besoin par voie vaginale, est prévue vers **32 SA**.

Si la position persiste

Un nouvel examen vers 36 SA aide à choisir avec vous le mode d'accouchement. Un placenta recouvrant conduit à une **césarienne programmée**, au plus tard à 37 SA et 6 jours.

Quand partir à la maternité

Saignement, même quelques gouttes, contractions ou douleurs du ventre : allez-y sans attendre. Saignement abondant ou malaise : appelez le **15** (ou le 112).

Au quotidien

- Signalez la position de votre placenta à tout professionnel qui vous examine : en cas de saignement, le toucher vaginal est évité tant qu'elle n'est pas vérifiée
- Activités, rapports sexuels et déplacements : parlez-en avec votre équipe, qui vous conseillera selon votre situation

Rhésus négatif

En cas de saignement au 2e ou au 3e trimestre, une injection d'immunoglobulines anti-D vous est proposée, de préférence dans les 72 heures.

Déjà eu une césarienne ?

Si le placenta est bas et situé en avant, un bilan ciblé recherche une adhérence anormale à la paroi de l'utérus (placenta accreta).

Sources · Jauniaux E et al., RCOG Green-top Guideline 27a, Placenta praevia and placenta accreta spectrum, BJOG 2026, PMID 42374711 · CNGOF, Prévention de l'allo-immunisation rhésus D fœto-maternelle, RPC 2005 · Jain V et al., SOGC, Management of a pregnant trauma patient, J Obstet Gynaecol Can 2015, PMID 26334607.

107 avenue Victor Hugo, 75116 Paris · Centre Geoffroy Saint-Hilaire, 75005 Paris
docteurkadoch.com · Docteur Kadoch Olivier, Paris, France

Document d'information · nov. 2026.
Il ne remplace pas la consultation.